




CEDIVET

Catálogo

2025

Precios vigentes desde el
1 de enero de 2025



 96 336 88 55

 www.cedivet.es

 info@cedivet.es

 [@cedivetvalencia](https://www.instagram.com/cedivetvalencia)

 <https://www.facebook.com/CEDIVETLABVALENCIA/>

00 ÍNDICE PÁG I

00 QUIÉNES SOMOS PÁG II

01 TABLAS PERFILES RESUMIDOS PÁG 02

01 PERFILES GENERALES PÁG 05

02 PERFILES POR SIGNOS PÁG 06

PERFILES METABÓLICOS PÁG. 06

PERFILES DIGESTIVOS PÁG. 08

PERFILES ENDOCRINOS PÁG. 09

03 PERFILES DE EXÓTICOS Y OTROS PÁG. 10

04 TÉCNICAS INDIVIDUALES PÁG. 11

05 ENFERMEDADES INFECCIOSAS PÁG. 12

PERFILES SEROLÓGICOS PERRO Y GATO PÁG. 12

NEUROLÓGICOS CANINOS PÁG. 15

NEUROLÓGICOS FELINOS PÁG. 16

ANTICUERPOS Y ANTÍGENOS PÁG. 17

BIOLOGÍA MOLECULAR PERRO PÁG. 19

BIOLOGÍA MOLECULAR GATO PÁG. 20

BIOLOGÍA MOLECULAR OTRAS ESPECIES PÁG. 23

BIOLOGÍA MOLECULAR LISTADO PÁG. 24

DIAGNÓSTICO GENÉTICO PÁG. 27

06 MUESTRA DE ORINA PÁG 28

07 MUESTRA DE HECES PÁG 29

08 MICROBIOLOGÍA PÁG 31

09 HISTOPATOLOGÍA Y LÍQ. BIOLÓGICOS PÁG 32

10 HEMATOLOGÍA Y HEMOSTASIA PÁG 33

00 ÍNDICE A-Z PÁG 35

Te recordamos que dispones de un
catálogo online dentro del
área de resultados:
<https://cedivet.analisisonline.com/login>



QUIÉNES SOMOS



RICARDO SERVER
CEO - RESPONSABLE DE LA GESTIÓN Y
OPERACIONES



RICARDO AGUAYO
MENSAJERO



MARÍA BLÁZQUEZ
TÉCNICO ESPECIALISTA SENIOR
COORDINADORA DE CALIDAD



F. JAVIER CALA
RESPONSABLE DE LOGÍSTICA



FRANCISCO CATALÁ - CFO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



IRIS MARTÍNEZ
ASESORÍA DIAGNÓSTICA.
RESPONSABLE DE MICROBIOLOGÍA



GEMMA MILLÁN
TÉCNICO SENIOR



JAVIER PÉREZ - CSO
DIRECTOR DE VENTAS



LAURA C. PEÑA
TÉCNICO ESPECIALISTA SENIOR
COORDINADORA DE PROCESOS




NÚRIA TABARES - CMO
COMUNICACIÓN Y MARKETING

Tipos de tubos y uso

Tubos de extracción

- ✓ Recuentos hematológicos
- ✓ Líquidos biológicos para PCR
- ✓ Líquidos para citología (médula ósea también)
- ✓ Medición ACTH endógena y actividad de renina
- ✗ Líquidos para cultivos
- ✗ Pruebas bioquímicas,
- ✗ Proteinograma, hormonas

Tubo EDTA



Tubo Citrato sódico

- ✓ Recuentos de plaquetas
- ✓ Tiempos y factores de coagulación
- ✓ Fibrinógeno, antitrombina
- ✗ Pruebas bioquímicas, proteinograma
- ✗ Hormonas

Tubo seco CON gel (SIN anticoagulante)

- ✓ Pruebas bioquímicas, proteinograma
- ✓ cortisol, hormonas tiroideas, folatos,
- ✓ cobalamina, TLI
- ✗ Progesterona, digoxina, levetiracetam
- ✗ Bromuro, fenobarbital

Tubo seco SIN gel (SIN anticoagulante)

- ✓ Todo lo que se puede medir en tubo seco con gel
- ✓ Progesterona, digoxina, levetiracetam
- ✓ Bromuro, fenobarbital
- ✓ Líquidos para cultivos



Orden de extracción de sangre



Tubo seco



Citrato



EDTA



Otros

Una precisión: cuando en los perfiles que llevan hemograma, escribimos "**frotis sanguíneo**", no nos limitamos a realizar un control visual de calidad del recuento automático. Realizamos una **evaluación citológica sanguínea** de la serie roja con recuento de poiquilocitos, policromatófilos (reticulocitos) e inclusiones intra-eritrocitarias. En la serie blanca evaluamos y cuantificamos la presencia de morfologías anormales y cambios tóxicos, y en la serie plaquetar, si hay presencia de agregados, macroplaquetas, y si el recuento se corresponde con el medido por el autoanalizador. Además, reportamos la presencia de parásitos como microfilarias o Hepatozoon, sin cobrar aparte una citología.

¿Cuántas veces ha entrado un paciente que presenta signos inespecíficos y no sabes por dónde empezar? Aquí tienes una serie de perfiles para esas ocasiones, de más a menos completos, dependiendo de lo que queráis profundizar y de la capacidad económica del cliente.

Si sacáis menos muestra de la deseada, ponédnos a qué queréis dar prioridad en la analítica.

PERFIL Y TIPO DE MUESTRA	DETERMINACIONES	MD
Completo premium + urianálisis + T4 L o T4T 0,5 mL E, 1 mL S 5 mL orina cistocentesis* 	Hemograma, frotis sanguíneo, ács. biliares, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, cloro, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, K, proteínas totales, Na triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina., cociente Na/K. Urianálisis completo  Sirve como geriátrico	MD
Completo Premium + T4 L o T4T 0,5 mL E, 1 mL S 	Hemograma, frotis sanguíneo, ács. biliares, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, cloro, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, K, proteínas totales, Na triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina., cociente Na/K.  Sirve como geriátrico	MD
Completo Premium + urianálisis (PEGC) 0,5 mL E, 1 mL S 5 mL orina cistocentesis* 	Hemograma, frotis sanguíneo, ács. biliares, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, cloro, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, K, proteínas totales, Na triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina., cociente Na/K. Urianálisis completo  Sirve como geriátrico	MD
Completo Premium (PCOM) 0,5 mL E, 1 mL S 	Hemograma, frotis sanguíneo, ács. biliares, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, cloro, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, K, proteínas totales, Na triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina., cociente Na/K.	MD
Completo básico (PEBA) 0,5 mL E, 0,7 mL S 	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina.	MD
General (PEMI) 0,5 mL E 0,5 mL S 	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, ALT, AST, creatinina, ALP, glucosa, proteínas totales, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina.	MD
Urianálisis (URCO) 5 mL orina cistocentesis* 	Sedimento, c. cetónicos, nitritos, pH, medición por espectrofotometría de proteínas, creatinina, GGT, glucosa, bilirrubina total, UPC, cociente GGT/creatinina., microalbuminuria.	MD
Coagulación (PECO) 0,5 mL sangre EDTA 0,5 mL plasma citrato 	Hemograma, frotis sanguíneo, Tiempo de Protrombina, Tiempo parcial de tromboplastina activada	MD
Coagulación extra (PCID) 0,5 mL E. 1 mL pl. citrato 	Hemograma, frotis sanguíneo, Tiempo de Protrombina, Tiempo parcial de tromboplastina activada, fibrinógeno, dímeros D.  Válido para evaluar riesgo de trombosis o CID. Puedes añadir antitrombina si lo quieres más completo	MD



MD: mismo día (laborable). Días laborables de lunes a viernes.

* Si se prevé que se ampliará a cultivo. Si se quiere realizar una citología urinaria para descartar neoplasia, enviar orina por micción espontánea o sondaje traumático

precios sin IVA (21%).

S = suero O = orina Hep =
pl. = plasma E = EDTA heparina



Especies exóticas

Bebe mucho y no aguanta el pis en casa...

Si con los resultados de urea, creatinina y UPC sigues queriendo confirmar si hay enfermedad renal, puedes añadir un SDMA

Otras veces, el motivo del dueño para llevarlo a consulta, es que el perro no consigue llegar a la calle para orinar, o el gato orina fuera de la caja, o tienen que cambiar la arena con más frecuencia. Para este tipo de problema, a parte de los perfiles generales que os hemos mostrado anteriormente, tenéis a disposición los siguientes:

PERFIL Y TIPO DE MUESTRA	DETERMINACIONES	€
Renal (PERE) 0,5 mL E, 0,5 mL S 5 mL orina	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, calcio, cloro, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, K, proteínas totales, Na, urea. Urianálisis: Sedimento, medición por espectrofotometría de proteínas creatinina, GGT, glucosa, c. cetónicos, bilirrubina total, cociente proteína/creatinina (UPC), cociente GGT/creatinina, microalbuminuria.	MD
Completo básico (PEBA) 0,5 mL E, 0,7 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina.	MD
Completo Premium (PCOM) 0,5 mL E, 1 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, ács. biliares, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, cloro, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, K, proteínas totales, Na triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina., cociente Na/K.  Para evaluar diabetes mellitus, fallo hepático, proceso infeccioso	MD
Completo Premium + urianálisis (PEGC) 0,5 mL E, 1 mL S 5 mL orina cistocentesis*	Hemograma, frotis sanguíneo, ács. biliares, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, cloro, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, K, proteínas totales, Na triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina., cociente Na/K. Urianálisis completo	MD
Adrenal (PADR) 0,5 mL E (pre-ACTH), 0,7 mL S pre y post ACTH	Hemograma, frotis sanguíneo, ALT, AST, calcio, cloro, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, K, Na triglicéridos, urea., cociente urea/creatinina., cociente Na/K. Cortisol pre y post ACTH.  Para estimulación ACTH	MD
Adrenal 3 cortisoles (ADR3) 0,5 mL E 0,7 mL S x 3 (T0, T4, T8)	Hemograma, frotis sanguíneo, ALT, AST, calcio, cloro, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, K, Na triglicéridos, urea., cociente urea/creatinina., cociente Na/K. Cortisol 3 tiempos (T0, T4, T8).  Para supresión con dexametasona	MD
Estimulación ACTH (PEEA) 0,7 mL S x 2	Cortisol T0, T1 (Comprobar en los protocolos endocrinos qué tiempo post ACTH según la ACTH empleada).	MD
Supresión dexametasona (SUPR) 0,7 mL S x 3	Cortisol T0, T4, T8	MD
Tiroideo felino (PETF) 0,5 mL sangre EDTA 0,7 mL suero	Hemograma, frotis sanguíneo ALT, AST, calcio, cloro, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, K, urea, cociente urea/creatinina. T4 total, TSH	MD

¿Te ha costado sacarle sangre y el suero que has sacado no llega al volumen que te pedimos? NO TE PREOCUPES, INTENTAREMOS EXPRIMIR EL TUBO AL MÁXIMO. PERO EN CASO DE QUE NO SEA SUFICIENTE, GANAMOS MUCHO TIEMPO SI NOS INDICAS YA EN LA PETICIÓN QUÉ PRUEBAS QUIERES QUE HAGAMOS PRIMERO.

S = suero O = orina Hep = heparina
pl. = plasma E = EDTA

 MD: mismo día (laborable). * Si se prevé que se ampliará a cultivo.
Si se quiere realizar una citología urinaria para descartar neoplasia, enviar orina por micción espontánea o sondaje traumático



Si con los resultados de urea, creatinina y UPC sigues queriendo confirmar si hay enfermedad renal, puedes añadir un SDMA



PERFIL Y TIPO DE MUESTRA	DETERMINACIONES	€
Hepático (PEHE) 0,5 mL E 0,7 mL S x 2 (pre y post-pandrial 2 h)	Hemograma, frotis sanguíneo, ács. biliares pre y post, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, cloro, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, K, proteínas totales, Na triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina, cociente Na/K.	MD
Hepático premium (PEHX) 0,5 mL E, 0,5 mL pl. Citrato 0,7 mL S x 2 (pre y post-pandrial 2 h)	Hemograma, frotis sanguíneo, ács. biliares pre y post, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, cloro, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, K, proteínas totales, Na triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina, cociente Na/K. + TP + aPTT	MD
Urianálisis + urocultivo (UCCO) 5 mL orina por cistocentesis*	Sedimento, pH, c. cetónicos, nitritos, proteinuria, creatininuria, GGT, glucosa, bilirrubina total, cociente proteína/creatinina (UPC), cociente GGT/creatinina, microalbuminuria, cultivo de orina que incluye identificación y antibiograma adecuado/s a la/s cepa/s.	1-3
Análisis cálculo vesical Cálculo/s urinario/s	Composición química	3
Cociente proteína /creatinina en orina (PRCR) 0,5 mL orina		MD
Cociente cortisol/ creatinina en orina (COCC) 0,5 mL primera orina de la mañana		MD
Cultivo de orina (EXC) 1 mL orina extraída por cistocentesis		3-4
Excreción fraccionada de electrolitos en orina (FUEQ) 1 mL de orina + 1 mL de suero		1



Para evaluar funcionalidad hepática total o si tienes que hacer biopsia hepática

¿Te ha costado sacarle sangre y el suero que has sacado no llega al volumen que te pedimos? NO TE PREOCUPES, INTENTAREMOS EXPRIMIR EL TUBO AL MÁXIMO. PERO EN CASO DE QUE NO SEA SUFICIENTE, GANAMOS MUCHO TIEMPO SI NOS INDICAS YA EN LA PETICIÓN QUÉ PRUEBAS QUIERES QUE HAGAMOS PRIMERO.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES DE PD/PU MÁS FRECUENTES:

Cambios en dieta, hiperadrenocorticismos canino y felino, hipoadrenocorticismos canino, hipertiroidismo felino, DM canina y felina, hepatopatía canina y felina, piometra canina y felina, pielonefritis canina y felina, enfermedad renal aguda o crónica canina y felina, algunos fármacos, hipercalcemia canina y felina.

¿Tienes un animal con sospecha de enfermedad renal y la urea y creatinina no son concluyentes?

Añade un cociente proteína/creatinina en orina o un SDMA.

¿Tiene hiperglucemia y quieres saber si es persistente o no? Añade fructosamina.

¿Quieres alguna bioquímica más? Añade las que están marcadas en azul en la lista de la página 11.

¿El tubo de EDTA ha llegado con un maldito coágulo (si, nosotros también maldecimos cuando eso ocurre)?

Pasa con cierta frecuencia: sacas sangre, se tarda un poco en llenar el tubo, o has redirigido la aguja, o la vena ha colapsado un poquito. En ese momento no se ve, pero al cabo de una media hora se observa un pequeño coágulo que hace imposible aspirarlo por el contador. No es culpa de nadie, y por eso si envías una nueva muestra de EDTA junto con otra muestra diferente (para no generar costes adicionales de transporte), lo realizamos sin coste.

En caso de que el propietario no quiera repetir la extracción, o no se pueda realizar una nueva toma de muestra, se cobrará el perfil entero sin descontar el hemograma. Lo mismo se aplica a las muestras de orina en los perfiles renales y las pruebas en el resto de los perfiles que no se puedan realizar..

S = suero O = orina
pl. = plasma E = EDTA

Hep =
heparina

* Si se prevé que se ampliará a cultivo. Si se quiere realizar una citología urinaria para descartar neoplasia, enviar orina por micción espontánea o sondaje traumático



MD: mismo día (laborable). Días laborables desde la llegada al laboratorio



Si con los resultados de urea, creatinina y UPC sigues queriendo confirmar si hay enfermedad renal, puedes añadir un SDMA por 10,39€

Uno de los motivos más frecuentes de consulta, aparte de las "indiscreciones" alimentarias. La lista de diagnósticos diferenciales es bastante amplia, dependiendo de la presentación del cuadro clínico, por lo que los perfiles bioquímicos (los infecciosos están en otra sección) son extensos para intentar cubrir la mayoría de las causas más comunes. Recordad que si no sabéis por donde empezar, un perfil completo es un buen comienzo, y se pueden ir ampliando pruebas.

PERFIL Y TIPO DE MUESTRA	DETERMINACIONES		€
Digestivo agudo (456) 0,5 mL E 0,7 mL S (ayunas) Heces de 3 días	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, bilirrubina total, ALT, AST, calcio, cloro, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, lipasa pancreática específica , K, proteínas totales, Na, triglicéridos, urea, cociente A/G, cociente Na/K, cociente urea/creatinina. Análisis de heces: flotación, sedimentación y examen en fresco.	MD	
Digestivo crónico canino (FHPA) 0,5 mL E 1 mL S (ayunas) Heces de 3 días TLI tarda 2 días	Hemograma, frotis sanguíneo, ácido fólico , albúmina, bilirrubina, calcio, cloro, cobalamina , colesterol, creatinina, ALT, ALP, fósforo, glucosa, GGT, lipasa pancreática específica , K, proteínas totales, Na, triglicéridos, TLI , urea, cociente A/G, cociente Na/K, cociente urea/creatinina, fructosamina. Análisis de heces: flotación, sedimentación y examen en fresco. Sangre oculta y digestión en heces (el animal no debe ingerir carne 24h antes)	MD menos TLI	
Digestivo crónico felino (CRP) 0,5 mL E, 1,3 mL S (ayunas) Heces de 3 días TLI felina tarda 8 días	Hemograma, frotis sanguíneo, ácido fólico , albúmina, bilirrubina, calcio, cloro, cobalamina , colesterol, creatinina, ALT, ALP, fósforo, GGT, glucosa, lipasa pancreática específica , K, proteínas totales, Na, triglicéridos, TLI felina , urea, cociente A/G, cociente Na/K, cociente urea/creatinina, fructosamina. Análisis de heces: flotación, sedimentación y examen en fresco. Sangre oculta y digestión en heces (el animal no debe ingerir carne 24h antes)	MD menos TLI	
Digestivo crónico felino + T4 Total (CRPT): 0,5 mL E, 1,3 mL S (ayunas) Heces de 3 días TLI felina tarda 8 días			
Estudio ampliado de heces (EAH) Heces de 3 días	Análisis de heces: flotación, sedimentación y examen en fresco. Extensión-tinción de heces, antígeno de Giardia sp. , sangre oculta y digestión en heces (el animal no debe ingerir carne 24h antes)	MD	
Estudio ampliado de heces + coprocultivo (EAHC) Heces de 3 días	Análisis de heces: flotación, sedimentación y examen en fresco. Extensión-tinción de heces, antígeno de Giardia sp. , sangre oculta y digestión en heces (el animal no debe ingerir carne 24h antes). Coprocultivo que incluye antibiograma de los patógenos aislados.	1-3	
Migración Larvaria (BAER) Heces de 3 días (al menos 70 g)	Análisis de heces por la técnica de Baermann. Te recomendamos que lo hagas sólo si antes han salido negativas la flotación y sedimentación, ya que en ellas las larvas se pueden observar también.	3	
Parasitológico de heces (APHE): Heces de 3 días	Análisis de heces: flotación, sedimentación y examen en fresco.	MD	



Para evaluar enfermedad renal, parásitos intestinales, pancreatitis, enteropatía perdedora de proteínas



Para evaluar enfermedad renal, parásitos intestinales, pancreatitis, enteropatía perdedora de proteínas, IPE

¿Te ha costado sacarle sangre y el suero que has sacado no llega al volumen que te pedimos?

NO TE PREOCUPES, INTENTAREMOS EXPRIMIR EL TUBO AL MÁXIMO. PERO EN CASO DE QUE NO SEA SUFICIENTE, GANAMOS MUCHO TIEMPO SI NOS INDICAS YA EN LA PETICIÓN QUÉ PRUEBAS QUIERES QUE HAGAMOS PRIMERO.

S = suero O = orina Hep =
pl. = plasma E = EDTA heparina



MD: mismo día (laborable). Días laborables desde la llegada al laboratorio



Se le cae mucho el pelo, no le pica

Los problemas dermatológicos son complicados de diagnosticar en base solamente a perfiles bioquímicos. Los perfiles que os mostramos pueden ayudaros a diagnosticar algunas alopecias endocrinas comunes. Encontraréis el resto de pruebas que se pueden realizar en otras secciones del catálogo para que podáis seleccionarlas en base al protocolo diagnóstico que tengáis establecido.

PERFIL Y TIPO DE MUESTRA	DETERMINACIONES	 €
Adrenal (PADR) 0,5 mL E 0,7 mL S pre y post ACTH	Hemograma, frotis sanguíneo, ALT, AST, calcio, cloro, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, K, Na triglicéridos, urea, , cociente urea/creatinina., cociente Na/K. Cortisol pre y post ACTH.	MD
 Para evaluar diabetes mellitus (DM), Cushing, hepatopatía		
Adrenal 3 cortisoles (ADR3) 0,5 mL E 0,7 mL S x 3	Hemograma, frotis sanguíneo, CK, ALT, AST, calcio, cloro, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, K, Na triglicéridos, urea, , cociente urea/creatinina., cociente Na/K. Cortisol T0, T4 y T8.	MD
Estimulación ACTH (PEEA) 0,7 mL S x 2	Cortisol T0, T1 (Comprobar en los protocolos endocrinos qué tiempo post ACTH según la ACTH empleada).	MD
Supresión dexametasona (SUPR) 0,7 mL S x 3	Cortisol T0, T4, T8	MD
Tiroideo canino T4T (PETM) 0,5 mL E 0,7 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, ALT, AST, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, urea, cociente urea/creatinina., triglicéridos, T4 total, TSH	MD
Tiroideo canino T4L (TCL) 0,5 mL E 0,7 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, ALT, AST, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, urea, cociente urea/creatinina., triglicéridos, T4 libre, TSH	MD
Tiroideo felino (PETF) 0,5 mL sangre EDTA 0,7 mL suero	Hemograma, frotis sanguíneo ALT, AST, calcio, cloro, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, fructosamina, GGT, glucosa, K, urea, cociente urea/creatinina. T4 total, TSH.	MD
T4 total + TSH (T4TS) 0,7 mL S		MD
T4 libre + TSH (TLTS) 0,7 mL S		MD

¿Te ha costado sacarle sangre y el suero que has sacado no llega al volumen que te pedimos?
NO TE PREOCUPES, INTENTAREMOS EXPRIMIR EL TUBO AL MÁXIMO. PERO EN CASO DE QUE NO SEA SUFICIENTE, GANAMOS MUCHO TIEMPO SI NOS INDICAS YA EN LA PETICIÓN QUÉ PRUEBAS QUIERES QUE HAGAMOS PRIMERO.



Si añades T4 libre o T4 total + TSH a cualquier perfil:

S = suero O = orina Hep =
pl. = plasma E = EDTA heparina



MD: mismo día (laborable). Días laborables desde la llegada al laboratorio

Otros perfiles y perfiles de exóticos



En caso de poco
volumen de muestra,
recuerda indicar las
bioquímicas prioritarias

Si no encuentras el perfil que te interesa, escríbenos con las pruebas que te interesan y el número mínimo aproximado de peticiones mensuales que nos harías para que podamos hacerte un perfil personalizado.

PERFIL Y TIPO DE MUESTRA	DETERMINACIONES	€
Prequirúrgico (PEPQ) 0,5 mL sangre EDTA 0,5 mL suero 0,5 mL plasma citrato	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, ALT, AST, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, GGT, glucosa, proteínas totales, proteinograma, urea, cociente urea/creatinina, tiempos de protrombina y tromboplastina. También adecuado para animales con epistaxis como primera aproximación	MD
Ionograma (PIOG) 0,7 mL S	Calcio, cloro, fósforo, K, Na, cociente Na/K.	MD
Equino 1 (EQ1) 0,5 mL E 0,7 mL S 0,5 mL pl. citrato	Hemograma, frotis sanguíneo, ácidos biliares (X 1), albúmina, AST, bilirrubina directa, indirecta y total, calcio, CK, cociente A/G, creatinina, fibrinógeno, ALP, GGT, Hierro, K, proteínas totales, Na, cloro, urea.	MD
Equino 2 (EQ2H) 0,5 mL E 0,7 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, AST, bilirrubina directa, indirecta y total, calcio, CK, cociente A/G, creatinina, ALP, GGT, Hierro, K, proteínas totales, Na, cloro, urea.	MD
Conejo (ORYC) 0,5 mL E 0,5 mL S o pl. heparina	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, AST, ácidos biliares, calcio, CK, cociente A/G, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, LDH, proteínas totales, urea, triglicéridos	MD
Renal Conejo (ORYR) 0,5 mL E 0,5 mL S o pl. heparina	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, calcio, cociente A/G, creatinina, fósforo, proteínas totales, urea.	MD
Peq. mamífero (2323) 0,5 mL sangre E 0,7 mL S o pl. hep	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, AST, calcio, CK, cociente A/G, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, LDH, proteínas totales, urea, triglicéridos	MD
Hurón (2002) 0,5 mL sangre E 0,7 mL S o pl. hep	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, ALT, bilirrubina, calcio, CK, colesterol, cociente A/G, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, K, proteínas totales, Na, urea.	MD
Reptil (2003) 0,6 mL pl. heparina	Ácido úrico, albúmina, AST, calcio, CK, colesterol, cociente A/G, fósforo, GGT, glucosa, LDH, proteínas totales, urea.	MD
Ave (2004) 0,6 mL pl. heparina	Ácido úrico, ácidos biliares, albúmina, AST, calcio, CK, colesterol, cociente A/G, fósforo, glucosa, LDH, proteínas totales.	MD

¿Te ha costado sacarle sangre y el suero que has sacado no llega al volumen que te pedimos? NO TE PREOCUPES, INTENTAREMOS EXPRIMIR EL TUBO AL MÁXIMO. PERO EN CASO DE QUE NO SEA SUFICIENTE, GANAMOS MUCHO TIEMPO SI NOS INDICAS YA EN LA PETICIÓN QUÉ PRUEBAS QUIERES QUE HAGAMOS PRIMERO.

S = suero O = orina
pl. = plasma E = EDTA



MD: mismo día (laborable). Días laborables desde la llegada al laboratorio

BIOQUÍMICAS BÁSICAS

PRUEBA	TIPO DE MUESTRA	€
Ácido úrico	0,3 mL S	1
Albumina	0,3 mL S	1
ALT	0,3 mL S	1
AST	0,3 mL S	1
Bilirrubina total	0,3 mL S	1
Calcio	0,3 mL S	1
Cloro (Cloruros)	0,3 mL S	1
Colesterol total	0,3 mL S	1
Creatinina	0,3 mL S	1
CK (Creatin Kinasa)	0,3 mL S	1
ALP	0,3 mL S	1
Fósforo	0,3 mL S	1
GGT	0,3 mL S	1
Glucosa	0,3 mL S	1
LDH	0,3 mL S	1
K	0,3 mL S	1
Proteínas totales	0,3 mL S	1
Proteínas ultrasensibles (LCR, orina)	0,3 mL	1
Proteinograma sérico mamífero	0,3 mL S	1
Proteinograma sérico reptil o ave	0,3 mL S	1
Proteinograma urinario (EC)	10 mL O	2
Na	0,3 mL S	1
Triglicéridos	0,3 mL S	1
Urea	0,3 mL S	1
Bqs adicionales a perfil (no incluye Na o K)		1

BIOQUÍMICAS ESPECIALES

PRUEBA	TIPO DE MUESTRA	€
Ác. Biliares 1 determinación	0,3 mL S	1
Ác. Biliares adicionales	0,3 mL S	1
Ác. Biliares pre + post pandriales	0,3 mL S	1
Acetilcolinesterasa eritrocitaria	1 ml sangre EDTA	5
Ác. Fólico (Folatos)	0,5 mL S	1
Ác. Metilmalónico	2 mL S congelado	22
Calcio iónico	contactar con el laboratorio	3
Cobalamina (Vit. B12)	0,5 mL S	1
Cobalamina (Vit. B12) + Ác. Fólico	0,8 mL S	1
Cobre	1 mL S	3
Cobre en tejidos	Tejido hepático fresco	4
Colinesterasa	0,5 mL S	2
Excreción fraccionada electrolitos orina	1mL S + 1 mL O	1
Fructosamina	0,5 mL S	1
Fructosamina adicional	0,5 mL S	1
GLDH	0,5 mL S	1
Lipasa pancreática específica	0,2 mL S	1
Lipasa pancreática adicional	0,2 mL S	1
Magnesio	1 mL S	3
Microalbuminuria	0,5 mL S	1
Osmolalidad en suero	0,7 mL S	1
ProBNP canino o felino	0,3 mL pl. EDTA	1
Proteína C reactiva	0,5 mL S	1
SDMA	0,2 mL S	1
Selenio	1 mL S	8
Taurina	1 mL plasma EDTA congelado	18
TLI canina (ayuno 12h)	0,5 mL S	2
TLI felina (ayuno 12h)	0,5 mL S	8
TLI canina + vit, B12 + Ác. Fólico (ayuno 12h)	1,3 mL S	2
TLI felina+ vit, B12 + Ác. Fólico (ayuno 12h)	1,3 mL S	8

ENDOCRINOLOGÍA

PRUEBA	TIPO DE MUESTRA	€
17-alfa-hidroxi-progesterona	0,3 mL S	5
17-beta-estradiol	1 mL S	3
Acs. antitiroglobulinas	0,5 mL S	5
ACTH	2 mL pl. EDTA congelado	3
Aldosterona	1 mL S congelado	10
Androstenodiona	0,4 mL S	6
Antimülleriana, hormona	0,5 mL S congelado	3
Cortisol	0,5 mL S	1
Cortisol x 2	0,5 mL S x 2	1
Dehidroepiandrosterona	2 mL S	5
Estradiol	0,5 mL S	4
FSH	1 mL S	3
Insulina (en ayunas)	1 mL S	3
LH	1 mL S	3
Parathormona intacta (PTH)	1 mL S congelado	4
PTH-related protein	1 mL pl. EDTA congelado	11
Progesterona	0,5 mL S tubo sin gel	1
Renina	2 mL de plasma EDTA	6
Somatomedina C (IGF-1)	0,5 mL S	4
Sulfato de estrona	1 mL S	6
T3 Libre	1 mL S	3
T3 Total	1 mL S	3
T4 diálisis equilibrio	1 mL S	12
T4 Libre	0,5 mL S	1
T4 Total	0,5 mL S	1
T4 T o L adicional a perfil	0,5 mL S	1
Testosterona	0,3 mL S	2
TSH	0,5 mL S	1
TSH adicional a perfil	0,5 mL S	1

FÁRMACOS, TÓXICOS Y OTROS

PRUEBA	TIPO DE MUESTRA	€
Acs. Antiacetilcolina receptores (IFI)	1 mL S	3
Amiodarona	1 mL S	12
Bromuro	0,3 mL S	2
Bromuro + Fenobarbital	0,7 mL S	2
Ciclosporina (sangre entera en EDTA)	1mL pl. EDTA congelado	2
Citología de masas y líquidos biológicos (muestra líquida en tubo EDTA)	1 mL mínimo	2-3
Digoxina	1 mL S	3
Fenobarbital (ver protocolo monitorización)	0,5 mL S (tubo sin gel)	1
Levetiracetam	1 mL S o pl. heparina	7
Mercurio	2 mL EDTA	8
Plomo	1 mL EDTA	6
Troponina I	0,5 mL S	1

S = suero O = orina Hep = heparina
pl. = plasma E = EDTA



MD: mismo día (laborable). Días laborables desde la llegada al laboratorio



Si tienes un título dudoso y un proteinograma normal y quieres saber si la infección está activa, puedes pedir una o varias proteínas de fase aguda

PERFIL Y TIPO DE MUESTRA

DETERMINACIONES



MD

Mínimo serológico Leishmania (LPME)	0,5 mL S	Proteinograma + Acs. Leishmania infantum	M y T
Mínimo serológico Ehrlichia (LC2)	0,5 mL S	Proteinograma + Acs. Ehrlichia canis	M y T
Mínimo serológico Rickettsia (RIPR)	0,5 mL S	Proteinograma + Acs. Rickettsia conorii	M y T
Mínimo serológico FeLV (FELB)	0,5 mL S	Proteinograma + Ag. Virus Leucemia Felina	M y T
Mínimo serológico FIV (BFIV)	0,5 mL S	Proteinograma + Acs. Virus Inmunodeficiencia	M y T
Mínimo serológico 2 serologías	0,5 mL S	Proteinograma + 2 pruebas a elegir entre: Leishmania, Ehrlichia canis, Rickettsia conorii, FeLV y FIV	M y T
Mínimo serológico 3 serologías (PECV)	0,5 mL S	Proteinograma + 3 pruebas a elegir entre: Leishmania, Ehrlichia canis, Rickettsia conorii, FeLV y FIV	M y T
Básico serológico Leishmania (PELO)	0,5 mL E 0,5 mL S	Hemograma, frotis, albúmina, ALT, AST, cociente A/G, creatinina, ALP, glucosa, prot. totales, urea, cociente urea/crea, PTG + Acs. Leishmania infantum	M y T
Básico serológico Ehrlichia (PEER)	0,5 mL E 0,5 mL S	Hemograma, frotis, albúmina, ALT, AST, cociente A/G, creatinina, ALP, glucosa, prot. totales, urea, cociente urea/crea, PTG + Acs. Ehrlichia canis	M y T
Básico serológico Rickettsia (PERI)	0,5 mL E 0,5 mL S	Hemograma, frotis, albúmina, ALT, AST, cociente A/G, creatinina, ALP, glucosa, prot. totales, urea, cociente urea/crea, PTG + Acs. Rickettsia conorii	M y T
Básico serológico FeLV (MFEL)	0,5 mL E 0,5 mL S	Hemograma, frotis, albúmina, ALT, AST, cociente A/G, creatinina, ALP, glucosa, prot. totales, urea, cociente urea/crea, PTG + Ag. Virus Leucemia Felina	M y T
Básico serológico FIV (MFIV)	0,5 mL E 0,5 mL S	Hemograma, frotis, albúmina, ALT, AST, cociente A/G, creatinina, ALP, glucosa, prot. totales, urea, cociente urea/crea, PTG + Acs. Virus Inmunodeficiencia	M y T
Básico serológico 2 serologías	0,5 mL E 0,5 mL S	Hemograma, frotis, albúmina, ALT, AST, cociente A/G, creatinina, ALP, glucosa, prot. totales, urea, cociente urea/crea, PTG + Acs. Virus Inmunodeficiencia+ 2 pruebas a elegir entre: Leishmania, Ehrlichia canis, Rickettsia conorii, FeLV y FIV	M y T
Básico serológico 3 serologías (TICG)	0,5 mL E 0,5 mL S	Hemograma, frotis, albúmina, ALT, AST, cociente A/G, creatinina, ALP, glucosa, prot. totales, urea, cociente urea/crea, PTG + Acs. Virus Inmunodeficiencia + 3 pruebas a elegir entre: Leishmania, Ehrlichia canis, Rickettsia conorii, FeLV y FIV	M y T

S = suero O = orina
pl. = plasma E = EDTA
Hep = heparina



MD: mismo día (laborable). Días laborables desde la llegada al laboratorio

M y T: mañana y tarde



Si tienes un título dudoso y un proteinograma normal y quieres saber si la infección está activa, puedes pedir una o varias proteínas de fase aguda

PERFIL Y TIPO DE MUESTRA

DETERMINACIONES



MD

Extra serológico Leishmania (PLEX)	0,5 mL E 0,7 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, CK, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina + Acs. Leishmania infantum	M y T
Extra serológico Ehrlichia (PEEE)	0,5 mL E 0,7 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, CK, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina + Acs. Ehrlichia canis	M y T
Extra serológico Rickettsia (PRCX)	0,5 mL E 0,7 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, CK, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina + Acs. Rickettsia conorii	M y T
Extra serológico FeLV (FEVX)	0,5 mL E 0,7 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, CK, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina + Ag. FeLV	M y T
Extra serológico FIV (FIVE)	0,5 mL E 0,7 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, CK, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina + Acs. FIV	M y T
Extra serológico 2 serologías	0,5 mL E 0,7 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, CK, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina + 2 pruebas a elegir entre: Leishmania, Ehrlichia canis, Rickettsia conorii, FeLV y FIV	M y T
Extra serológico 3 serologías (TIEX)	0,5 mL E 0,7 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, CK, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina + 3 pruebas a elegir entre: Leishmania, Ehrlichia canis, Rickettsia conorii, FeLV y FIV	M y T

Añade a cualquier perfil:

- Proteína C reactiva
- Cociente proteína/creatinina (UPC) 0,5 mL orina
- Fructosamina
- Lipasa pancreática específica
- T4 Total, o T4 libre, o TSH
- Ácidos biliares, 1 determinación

y lo tendrás en el mismo día

S = suero
pl. = plasma

O = orina
E = EDTA

Hep =
heparina



MD: mismo día (laborable). Días laborables desde la llegada al laboratorio

M y T: mañana y tarde



La detección de infecciones por virus frente a los que se vacunan a cachorros y gatitos es mejor por PCR, ya que las serologías no diferencian infección vacunal de natural

05 ENFERMEDADES INFECCIOSAS

CÓD.	TIPO DE MUESTRA	DETERMINACIONES	€
1010	Heces, 0,3 mL S	Digestivo vírico felino: FeLV ag., FIV acs., Panleucopenia felina ag., Coronavirus felino ag.	MD
1011	Hisopo bucal, nasal, 0,3 mL S	Vías respiratorias altas y boca vírico felino: FeLV ag., FIV acs., PCR Calicivirus, PCR Chlamydia, PCR Herpesvirus	3-4
2026	Lavado broncoalveolar	Vías respiratorias bajas felino 1: PCR Calicivirus, PCR Bordetella, PCR Herpesvirus, PCR Mycoplasma spp.	3-4
1012	Lavado broncoalveolar	Vías respiratorias bajas felino 2: PCR Calicivirus, PCR Bordetella, PCR Herpesvirus, PCR Mycoplasma spp., PCR Toxoplasma	3-4
1013	Hisopo ocular	Ocular felino: PCR Calicivirus, PCR Chlamydia, PCR Herpesvirus, PCR Mycoplasma spp.	3-4
2030	0,5 mL E	Anemia felina 1: PCR C. Mycoplasma haemofelis, haemominutum, turicensis, PCR FeLV, PCR FIV.	3-4
2031	0,5 mL E	Anemia felina 2: PCR C. Mycoplasma haemofelis, haemominutum, turicensis	3-4
HVGM	0.3 mL S, pl.	Herpesvirus felino IgG + IgM, acs.	MD
LEHR	0.3 mL S, pl., LCR	Leishmania infantum + Ehrlichia canis, acs. IgG	M y T
DIRL	0.3 mL S, pl., LCR	Leishmania infantum + Rickettsia conorii, acs. IgG	M y T
PEIF	0.3 mL S, pl., LCR	Leishmania infantum + Ehrlichia canis + Rickettsia conorii, acs. IgG	M y T
MOCA	0.3 mL S, pl., LCR	Moquillo canino IgG + IgM, acs.	M y T
ESTE	0.3 mL S, pl.	Panleucopenia felina IgG + IgM, acs.	MD
PEPC	Heces	Parvovirus canino ag + Coronavirus canino ag	M y T
PARV	0.3 mL S, pl.	Parvovirus canino IgG + IgM, acs.	M y T
NECA	0.3 mL S, pl., LCR	Neospora caninum IgG + IgM, acs.	M y T
PETX	0.3 mL S, pl., LCR	Toxoplasma gondii IgG + IgM, acs.	M y T
BSP	0.3 mL S, pl., LCR	Bartonella sp. IgG + IgM, acs.	MD

M = Mañana T = Tarde MD = mismo día
M = Los días se refieren días laborables de L a V desde la llegada al laboratorio

PERFIL Y TIPO DE MUESTRA	DETERMINACIONES	
Ag <i>Cryptococcus</i> spp.	1 mL S o LCR	4
Neurológico canino 1 (6666)	0,5 mL E 1 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, ácidos biliares (x 1), albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, CK, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, T4 libre, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina, <i>Neospora caninum</i> IgG + IgM, <i>Toxoplasma gondii</i> IgG + IgM, Moquillo canino IgG + IgM.
Neurológico canino 2 (6665)	0,5 mL E 1 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, ácidos biliares (x 1), albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, CK, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, T4 libre, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina, <i>Neospora caninum</i> IgG + IgM, <i>Toxoplasma gondii</i> IgG + IgM, <i>L. infantum</i> , <i>E. canis</i> .
Neurológico canino 3 (6667)	0,5 mL E 1 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, ácidos biliares (x 1), albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, CK, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, T4 libre, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina, <i>Neospora caninum</i> IgG + IgM, <i>Toxoplasma gondii</i> IgG + IgM, <i>L. infantum</i> , <i>E. canis</i> , Moquillo canino IgG + IgM.
Neurológico canino 4 (1004)	0,5 mL S	<i>Neospora caninum</i> IgG + IgM, <i>Toxoplasma gondii</i> IgG + IgM, <i>E. canis</i> , Moquillo canino IgG + IgM.
Neurológico canino 5 (1005)	0,5 mL S	<i>Neospora caninum</i> IgG + IgM, <i>Toxoplasma gondii</i> IgG + IgM, <i>E. canis</i> , <i>L. infantum</i> .
Neurológico canino 6 (NDTN)	0,5 mL S	<i>Neospora caninum</i> IgG + IgM, <i>Toxoplasma gondii</i> IgG + IgM.
Neurológico canino 7 (PNES)	0,5 mL S	<i>Neospora caninum</i> IgG + IgM, <i>Toxoplasma gondii</i> IgG + IgM, Moquillo canino IgG + IgM.
Seguimiento epilepsia (PCEP)	0,5 mL S	Fenobarbital, ALP, ALT

M = Mañana T = Tarde MD = mismo día
M = Los días se refieren días laborables de L a V desde la llegada al laboratorio

Sólo recomendamos medir anticuerpos de moquillo si el animal no está vacunado y es mayor de 4 meses. En caso contrario, es mejor realizar una PCR de este virus



MD: mismo día (laborable). Días laborables desde la llegada al laboratorio



En los perfiles neurológicos felinos no incluimos anticuerpos **anti-Coronavirus** felino por su baja especificidad. Recomendamos realizar **PCR** en su lugar

PERFIL	TIPO DE MUESTRA	DETERMINACIONES		€
Ag Cryptococcus spp.	1 mL S o LCR		4	
Neurológico Felino 1 (PNF1)	0,5 mL E 1 mL S	Hemograma, frotis sanguíneo, ácidos biliares (x 1) albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, CK, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina, Toxoplasma gondii IgG + IgM , Ag Virus de Leucemia felina , Acs. Virus de inmunodeficiencia felina .	M y T	
Neurológico Felino 2 (PNF2)	0,5 mL E 1 mL S Heces	Hemograma, frotis sanguíneo, ácidos biliares (x 1) albúmina, ALT, AST, bilirrubina total, calcio, CK, cociente A/G, colesterol, creatinina, ALP, fósforo, GGT, glucosa, proteínas totales, triglicéridos, urea, proteinograma, cociente urea/creatinina, Toxoplasma gondii IgG + IgM , Ag Virus de Leucemia felina , Acs. Virus de inmunodeficiencia felina , Ag de Panleucopenia felina	M y T	
Neurológico Felino 3 (PNF3)	0,5 mL S	Ag Virus de Leucemia felina , Acs. Virus de inmunodeficiencia felina .	M y T	
Neurológico Felino 4 (PNF4)	0,5 mL S Heces	Ag Virus de Leucemia felina , Acs. Virus de inmunodeficiencia felina , Ag de Panleucopenia felina .	M y T	
Neurológico Felino 5 (PNF5)	0,5 mL S	Ag Virus de Leucemia felina , Acs. Virus de inmunodeficiencia felina , Toxoplasma gondii IgG + IgM .	M y T	
Seguimiento epilepsia (PCEP)	0,5 mL S	Fenobarbital, ALP, ALT	MD	



Las serologías que aparecen en los perfiles neurológicos, también se pueden hacer en LCR. Sin embargo, te recomendamos para LCR que hagas PCRs de los mismos agentes (consulta la sección de biología molecular)

M = Mañana T = Tarde MD = mismo día
M = Los días se refieren días laborables de L a V desde la llegada al laboratorio



MD: mismo día (laborable). Días laborables desde la llegada al laboratorio

Perro y gato

CÓD	PRUEBA	TIPO DE MUESTRA		€
	1 serología tipo A	0,2 mL S	1	
SERA	1 serología adicional tipo A	0,2 mL S	1	
	1 serología tipo B	0,2 mL S	1	
SERB	1 serología adicional tipo B	0,2 mL S	1	
	1 serología tipo C (IgG + IgM)	0,3 mL S	1	
SERC	1 serología adicional tipo C (IgG + IgM)	0,3 mL S	1	
SERD	2 serologías adicionales tipo A	0,2 mL S	1	
S2B	2 serologías adicionales tipo B	0,2 mL S	1	
S2C	2 serologías adicionales tipo C (IgG + IgM)	0,3 mL S	1	
S3A	3 serologías adicionales tipo A	0,2 mL S	1	
S3B	3 serologías adicionales tipo B	0,2 mL S	1	
S3C	3 serologías adicionales tipo C (IgG + IgM)	0,3 mL S	1	
ACS3	Adenovirus 1 y 2, Acs.	0,5 mL S	7	
ANPH	Anaplasma phagocytophilum (E, equi), Acs.	0,2 mL S	1	
APGM	Anaplasma phagocytophilum IgG + IgM, Acs.	0,2 mL S	1	
PHAM	Anaplasma phagocytophilum IgM, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
PHAG	Anaplasma phagocytophilum IgG, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
AVAS	Angiostrongylus vasorum, Ag	0,5 mL S	2	
ASPE	Aspergillus fumigatus, Acs.	0,5 mL S	9	
ACBA	Babesia canis IgG, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
ABB	Babesia canis IgM, Acs (B)	0,2 mL S	1	
BGAD	Bartonella hensellae IgG, Acs.	0,2 mL S	1	
BHIM	Bartonella hensellae IgM, Acs	0,2 mL S	1	
524	Bartonella hensellae IgG + IgM, Acs	0,2 mL S	1	
BORG	Borrelia burgdorferi IgG, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
BORM	Borrelia burgdorferi IgM, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
BOBU	Borrelia burgdorferi IgG + IgM, Acs.	0,2 mL S	1	
BCAC	Brucella canis, Acs. (SAT)	0,2 mL S	3	
CVIG	Calicivirus Felino IgG, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
CVIM	Calicivirus Felino IgM, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
CPL	Chlamydophila psittaci, Acs.	0,2 mL S	2	
CHFE	Chlamydophila sp., Acs.	0,2 mL S	2	
ACCF	Coronavirus felino, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
ACRY	Cryptococcus spp., Ag	1 mL S	3	
CRY	Cryptosporidium sp., Ag	Heces	1	

S = suero O = orina Hep =
pl. = plasma E = EDTA heparina

 Días laborables desde la llegada al laboratorio

CÓD	PRUEBA	TIPO DE MUESTRA		€
DIRO	Dirofilaria immitis, Ag	0,2 mL S	1	
EIFI	Ehrlichia canis IgG, Acs. (A)	0,2 mL S	1	
AGGI	Giardia sp., Ag	Heces	1	
HEP	Herpesvirus canino IgG, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
HPM	Herpesvirus canino IgM, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
ACHC	Herpesvirus canino, Acs. totales	0,2 mL S	1	
EHV1	Herpesvirus equino 1+4 (rinoneumonitis) Acs.	1 mL S	12	
ACHF	Herpesvirus Felino IgG, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
AHFM	Herpesvirus Felino IgM, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
PREF	Herpesvirus felino IgG+M, Acs.	0,2 mL S	1	
LIFI	Leishmania infantum IgG, Acs. (A)	0,2 mL S	1	
LIFF	Leishmania infantum TITULO FINAL, Acs.	0,2 mL S	1	
LPT	Leptospira spp, Acs.	0,5 mL S	2	
MFT	Microfilarias, cuantificación (Test Knott)	2 mL sangre EDTA	2	
ACMG	Moquillo canino IgG, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
AGMO	Moquillo canino IgM, Acs. Acs. (B)	0,2 mL S	1	
MOCA	Moquillo canino, IgG+M, Acs.	0,2 mL S	1	
CAMO	Moquillo canino, Ag	hisopo seco conjuntival, heces	1	
NEOG	Neospora caninum IgG, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
NEOM	Neospora caninum IgM, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
NECA	Neospora caninum, IgG+M, Acs.	0,2 mL S	1	
PANA	Panleucopenia Felina IgG, Acs. (B)	0,2 mL S	1	
IPBI	Panleucopenia Felina IgM, Acs. (B)	0,2 mL S	2	
PANL	Panleucopenia felina, Acs. Totales	0,2 mL S	1	
44	Panleucopenia Felina, Ag	Heces	1	
APVG	Parvovirus IgG, Acs.	0,2 mL S	1	
APVM	Parvovirus IgM, Acs.	0,2 mL S	1	
PARV	Parvovirus, IgG+M, Acs.	0,2 mL S	1	
PVAG	Parvovirus, Ag	Heces	1	
ACRC	Rickettsia conorii IgG, Acs. (A)	0,2 mL S	1	
SAQC	Sarcoptes scabiei, Acs.	0,5 mL S	3	
TOXG	Toxoplasma, Acs. IgG	0,2 mL S	1	
TOXM	Toxoplasma, Acs. IgM	0,2 mL S	1	
PETX	Toxoplasma, IgG+M, Acs.	0,2 mL S	1	
ACIF	Virus Inmunodeficiencia Felina, Acs. (A)	0,2 mL S	1	
AGLF	Virus Leucemia Felina (FeLV), Ag (A)	0,2 mL S	1	

S = suero
pl. = plasma

O = orina
E = EDTA

Hep =
heparina



Días laborables desde la llegada al laboratorio

Otras especies

CÓD	PRUEBA	TIPO DE MUESTRA	€
ANPH	Anaplasma phagocytophilum (E. equi)	0,5 mL S	1
AIEQ	Anemia infecciosa equina, Acs. ELISA	2 mL S	2
COGG	Anemia infecciosa equina, test Coggins	0,5 mL S	5
AVEQ	Arteritis viral equina, Acs.	0,5 mL S	7
BACA	Babesia caballi, Acs.	0,5 mL S	1
BORG	Borrelia burgdorferi IgG (B) caballo	0,5 mL S	1
BORM	Borrelia burgdorferi IgM (B) caballo	0,5 mL S	1
ECG	E. cuniculi, IgG Acs. Conejo, cobaya	0,5 mL S	2
ECUN	Encephalitozoon cuniculi G+ M, Conejo, Cobaya	0,5 mL S	3
AGGI	Giardia sp., Ag, roedores, hurón, conejo	heces	1
EHV1	Herpesvirus equino 1+4 (rinoneumonitis)	1 mL S	5
LPT	Leptospira spp., Acs. Caballo	0,5 mL S	6
MIXO	Mixomatosis, Acs. Conejo	0,5 mL S	11
CLTE	Tétanos, Acs.	2 mL S	9 a 16
THEQ	Theileria equi, Acs. Caballo	0,5 mL S	1
TBEG	Tick Borne Encephalitis IgG, Acs.	0,5 mL S	3
TBEM	Tick Borne Encephalitis IgM, Acs.	0,5 mL S	5
PETX	Toxoplasma gondii IgM + IgG Conejo, cobaya, eq.	0,5 mL S	2
TRCP	Treponema paraluis-cuniculi, Acs. Conejo	0,5 mL S	5



Días laborables desde la llegada al laboratorio

S = suero O = orina
pl. = plasma E = EDTA

Hep =
heparina

PERFIL Y TIPO DE MUESTRA

DETERMINACIONES



Aborto/infertilidad 1 perro (9991)	Escobillón vaginal tras aborto en hembras, semen y escobillón nasal y conjuntival en machos, sangre EDTA 0,5 mL de madre y cachorros, tejidos fetales.	Brucella spp., Chlamydomphila spp., Herpesvirus canino	3-4
Aborto/infertilidad 2 perro (9992)	Escobillón vaginal tras aborto en hembras, semen y escobillón nasal y conjuntival en machos, sangre EDTA 0,5 mL de madre y cachorros, tejidos fetales. Escobillón rectal hembras (para Salmonella)	Brucella spp., Chlamydomphila spp., Herpesvirus canino, Salmonella spp. Leptospira spp.	3-4
Entérico canino (9993)	Heces	 Puedes testar Ag de Moquillo, Parvovirus y Coronavirus para complementarlo, aunque si quieres más sensibilidad, también tenemos estas PCRs C. perfringens enterotoxina, Campylobacter spp., Giardia spp., Salmonella spp.	3-4
Respiratorio 1 perro (9994)	Hisopo bucal, nasal, conjuntival	Adenovirus, Herpesvirus, Moquillo	3-4
Respiratorio 2 perro (9995)	Hisopo bucal, nasal, conjuntival, lavado traqueobronquial (recomendado)	Adenovirus, Herpesvirus, Moquillo, Parainfluenza, Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma spp.	3-4
Fiebre de origen desconocido perro (AZAR)	0,5 mL sangre EDTA, médula ósea, linfonódulo	Babesia spp., Anaplasma spp. Ehrlichia canis, Rickettsia spp.	3-4
Neurológico canino (1001)	0,5 mL LCR	Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Moquillo, E. canis, Cryptococcus spp.	3-4



Te recomendamos que sólo hagas PCR de E. canis y Rickettsia en sangre si sabes que estás en el primer mes post-infección, porque después la PCR dará negativa

Al final de esta sección tienes un listado de agentes por orden alfabético

PERFIL Y TIPO DE MUESTRA	DETERMINACIONES		€
Respiratorio felino vías altas y boca 1 (2024)	Hisopo nasal, hisopo bucal, hisopo conjuntival sin medio	Herpesvirus felino PCR, Calicivirus felino PCR	3-4
Respiratorio felino vías altas y boca 2 (2025)	Hisopo nasal, hisopo bucal, hisopo conjuntival sin medio	Herpesvirus felino PCR, Calicivirus felino PCR, Chlamydia spp. PCR	3-4
Respiratorio felino vías bajas 1 (2026)	Lavado bronco-alveolar	Herpesvirus felino PCR, Calicivirus felino PCR, Mycoplasma spp. PCR, Bordetella bronchiseptica PCR	3-4
Respiratorio felino vías bajas 2 (1012)	Lavado broncoalveolar	Toxoplasma gondii PCR, Calicivirus PCR, Herpesvirus PCR, Mycoplasma spp. PCR, Bordetella bronchiseptica PCR	3-4
Respiratorio felino vías altas (1011)	0,3 mL suero (ELISA) + hisopo bucal sin medio	FeLV ag., FIV acs., Calicivirus PCR, Herpesvirus PCR, Chlamydia spp. PCR	3-4
Ocular felino (1013)	hisopo conjuntival sin medio	Mycoplasma spp. PCR, Calicivirus PCR, Herpesvirus PCR, Chlamydia spp. PCR	3-4
Entérico felino 1 (2027)	Heces	C. perfringens enterotoxina PCR, C. difficile toxina A y B PCR, C. jejuni PCR, C. coli PCR, Salmonella spp. PCR, Tritrichomonas foetus PCR, Giardia spp. PCR, T. gondii PCR	3-4
Entérico felino 2 (2028)	Heces	Toxoplasma gondii PCR, Salmonella spp. PCR, Tritrichomonas foetus PCR, Giardia spp. PCR	3-4
Entérico felino 3 (2029)	Heces	Tritrichomonas foetus PCR, Giardia spp. PCR	3-4

Al final de esta sección tienes un listado de agentes por orden alfabético



MD: mismo día (laborable). Días laborables desde la llegada al laboratorio



05 ENFERMEDADES INFECCIOSAS

PERFIL Y TIPO DE MUESTRA	DETERMINACIONES	€
Aborto/infertilidad 1 gato (2022)	Escobillón vaginal tras aborto en hembras, semen y escobillón nasal y conjuntival en machos, sangre EDTA 0,5 mL de madre y cachorros, tejidos fetales.	Herpesvirus felino, Calicivirus felino, Toxoplasma gondii 3-4
Aborto/infertilidad 2 gato (2023)	Hisopo vaginal, nasal, conjuntival y de heces tras aborto en hembras, semen e hisopo nasal y conjuntival en machos, sangre EDTA 0,5 mL de madre y cachorros, tejidos fetales.	Herpesvirus, Calicivirus, Coronavirus, FeLV, Panleucopenia, T. gondii 3-4
Anemia felino 1 (2030)	0,5 mL sangre EDTA	C. Mycoplasma haemofelis , C. Mycoplasma haemominutum, C. Mycoplasma turicensis, FeLV, FIV 3-4
Anemia felino 2 (2031)	0,5 mL sangre EDTA	C. Mycoplasma haemofelis , C. Mycoplasma haemominutum, C. Mycoplasma turicensis 3-4
Neurológico felino (2032)	0,5 mL LCR	Coronavirus felino, FIV, Cryptococcus spp., Toxoplasma gondii 3-4



Al final de esta sección tienes un listado de agentes por orden alfabético

Al final de esta sección
tienes un listado de agentes
por orden alfabético

PERFIL PCR	TIPO DE MUESTRA		
Aborto/infertilidad equino (2033) 	Hisopo vaginal tras aborto en hembras, semen e hisopo nasal y conjuntival en machos, sangre EDTA 0,5 mL de madre y potro, tejidos fetales.	Arteritis viral equina, HVE 1 y 4, Taylorella equigenitalis, Leptospira spp.	3-4
Respiratorio equino (2034) 	Hisopo faríngeo sin medio, lavado transtraqueal	HVE 1 y 4, Influenza A, Streptococcus equi, Arteritis viral equina	3-4
Digestivo equino (2035) 	Heces	C. perfringens enterotoxina, C. perfringens toxina alfa, Salmonella spp., C. difficile Toxina A y B	3-4
Respiratorio conejo (2036) 	Hisopo nasal y bucal	Bordetella bronchiseptica, Chlamydia spp, Pasteurella multocida	3-4
General ave 1 (2037) 	Heces, sangre EDTA o pluma	Polyomavirus, Circovirus, Chlamydophila sp.	3-4
General ave 2 (2038) 	Heces, sangre EDTA o pluma	Polyomavirus, Circovirus, Herpesvirus, Chlamydophila sp., Chlamydia spp., Bornavirus	3-4
Respiratorio hurón (2039) 	Hisopo nasal y bucal sin medio	Influenza A, Moquillo	3-4

PCRS DEL MISMO ANIMAL

1 PCR

2 PCRS

3 PCRS

4 PCRS

5 PCRS

6 PCRS

7 PCRS

8 PCRS



CÓDIGO	PRUEBA	TIPO DE MUESTRA	 €
AVR	Adenovirus reptil	Heces o tejidos	15
ADV	Adenovirus Tipo 1	0.5 mL sangre EDTA u orina	3
TIPO	Adenovirus tipo 2	Hisopo nasal o lavado traqueal	3
PCAN	Anaplasma phagocytophilum	0.5 mL sangre EDTA	3
APLP	Anaplasma platys	0.5 mL sangre EDTA	3
ANSP	Anaplasma spp.	0.5 mL sangre EDTA	3
ART	Arteritis viral equina	0.5 mL sangre EDTA	3
PBAC	Babesia caballi	0.5 mL sangre EDTA	3
PBAB	Babesia canis	0.5 mL sangre EDTA	3
PCBF	Babesia felis	0.5 mL sangre EDTA	3
PCRB	Babesia spp	0.5 mL sangre EDTA	3
1591	Bartonella spp.	0.5 mL sangre, tejidos o LCR	3
BORB	Bordetella bronchiseptica	Hisopo bucal o nasal sin medio, lavado broncoalveolar	3
BORP	Bordetella spp.	Hisopo bucal o nasal sin medio, lavado broncoalveolar	3
BORN	Bornavirus	0.5 mL EDTA, heces o hisopo nasal	3
BOR	Borrelia burgdorferi	0.5 mL sangre EDTA	3
BC	Brucella canis	0.5 mL sangre EDTA, hisopo vaginal sin medio o semen	3
HAEM	C. Mycoplasma haemocanis	0,5 mL sangre EDTA	3
IAD1	C. Mycoplasma haemofelis	0,5 mL sangre EDTA	3
MINU	C. Mycoplasma haemominutum	0,5 mL sangre EDTA	3
TURI	C. Mycoplasma turicensis	0,5 mL sangre EDTA	3
CALP	C. perfringens alfatoxina	Heces	3
CENT	C. perfringens enterotoxina	Heces	3
PCVF	Calicivirus Felino	Hisopo bucal o nasal sin medio, lavado broncoalveolar	3
CCOL	Campylobacter coli	Heces	3
JEJU	Campylobacter jejuni	Heces	3
CPHC	Campylobacter spp.	Heces	3

CÓDIGO	PRUEBA	TIPO DE MUESTRA		€
CHLP	Chlamydia spp.	Heces, escobillón conjuntival	3	
PCCH	Chlamydia felis	Tejidos de fetos abortados, secreción vaginal	3	
PCCL	Chlamydia psittaci	Tejidos, heces, hisopo conjuntival sin medio	3	
CLRZ	Clasificación racial	1 mL EDTA o dos hisopos bucales sin medio	23	
CPAB	Clostridium difficile Toxina A y B	Heces	3	
CPER	Clostridium perfringens	Heces	3	
MCBO	Complejo M. bovis	Tejidos	3	
PCAV	Complejo Mycobacterium Avium	Tejidos	3	
COC	Coronavirus canino heces	Heces	3	
COFV	Coronavirus felino	Derrame cavitario, sangre EDTA	3	
COFH	Coronavirus felino heces	Heces	3	
COXI	Coxiella burnetti	0.5 mL sangre EDTA, líquido sinovial	3	
CGAT	Cryptococcus gatti	LCR, hisopo nasal sin medio	3	
PCCR	Cryptococcus neoformans	LCR, hisopo nasal sin medio	3	
PCRW	Cryptococcus spp.	LCR, hisopo nasal sin medio	3	
CRYP	Cryptosporidium sp.	Heces	3	
CYTA	Cytauxzoon felis	0,5 mL sangre EDTA	3	
PCRF	Dirofilaria immitis	1 mL sangre EDTA	3	
ICEQ	Dirofilaria repens	2 mL sangre EDTA	3	
ENTE	E. coli enterohemorrágico	Heces	2	
ECP	E. Coli enteropatógeno	Heces	2	
PCEH	Ehrlichia canis	Médula ósea, linfonódulo	3	
ECP1	Encephalitozoon cuniculi	Tejidos, orina, LCR, hisopo sin medio de zona a evaluar	5	
PGUM	Enf. Gumboro	Bolsa de Fabricio	3	
PBFD	Enf. pico y plumas (Circovirus)	0.3 mL de sangre EDTA, hisopo cloacal o plumas	3	
VW1	Enf. von Willebrand tipo I	2 hisopos bucales	7	
TBC	Género Mycobacterium	Tejidos	3	

CÓDIGO	PRUEBA	TIPO DE MUESTRA		€
HEL	Helicobacter pylori	Vómito, mucosa gástrica	3	
HPZ	Hepatozoon canis	0.5 mL sangre EDTA	3	
PHAV	Herpesvirus aviar	0.5 mL sangre EDTA, hisopo de cloaca sin medio	3	
PHVC	Herpesvirus canino	Hisopo nasal, vaginal sin medio, tejido pulmonar, semen	3	
HV14	Herpesvirus equino 1-4	Lavado broncoalveolar, hisopo faríngeo, nasal sin medio	3	
HVII	Herpesvirus equino tipo 2	Heces	3	
HPV5	Herpesvirus equino tipo 5	0.5 mL EDTA, heces	3	
PCRH	Herpesvirus felino	Hisopo oral, conjuntival, nasal sin medio, tejidos postmortem	3	
HRP	Herpesvirus reptil	Heces, tejidos	7	
IFLA	Influenza A	Lavado broncoalveolar, hisopo faríngeo, nasal sin medio	3	
PCRL	Leishmania infantum (q-PCR)	0.5 mL sangre EDTA, médula ósea, aspirado de tejidos en SSF	3	
PCLE	Leptospira patógena	0.5 mL de orina	3	
MHF	Mycoplasma hemotrópico (spp.)	0.5 mL sangre EDTA	3	
MYR	Mycoplasma respiratorio (spp.)	Lavado broncoalveolar preferible, hisopo faríngeo, nasal sin medio	3	
CDVP	Moquillo canino	Heces, 0.5 mL de orina, LCR, hisopo conjuntival, nasal, bucal sin medio	3	
TBC1	Mycobacterium avium	Tejidos	3	
BOV	Mycobacterium complejo Bovis	Tejidos	3	
PCRM	Mycobacterium complejo Tuberculosis	Tejidos	3	
PMYC	Mycobacterium spp	Tejidos	3	
8437	Mycoplasma felis (respiratorio)	Lavado broncoalveolar preferible, hisopo faríngeo, nasal sin medio	3	
MSPP	Mycoplasma spp.	Lavado broncoalveolar preferible, hisopo faríngeo, nasal sin medio	3	
NCPC	Neospora caninum	0.5 mL LCR, sangre EDTA, tejidos postmortem	3	
PCRP	Panleucopenia felina	Heces, tejidos postmortem	3	
INFL	Parainfluenza	Lavado broncoalveolar preferible, hisopo faríngeo, nasal sin medio	3	
PARX	Paramixovirus	Heces	3	
PARE	Parentesco 2 individuos	1 mL sangre EDTA de cada animal	3	
PARP	Parvovirus canino	Heces, tejidos postmortem	3	

 Días laborables desde la llegada al laboratorio

CÓDIGO	PRUEBA	TIPO DE MUESTRA		€
POLI	Polyomavirus	0.3 mL de sangre EDTA, hisopo cloacal o plumas	6	
POX	Poxvirus	Costras	3	
RCPC	Rickettsia spp.	Médula ósea, linfonódulo	3	
PCRN	Rinoneumonitis equina	Lavado broncoalveolar preferible, hisopo faríngeo, nasal sin medio	3	
PCRS	Salmonella spp.	Heces, tejidos postmortem	3	
SXAV	Sexaje aves	0.3 mL de sangre EDTA o plumas	3	
SHIG	Shigella spp.	Heces	3	
STEQ	Streptococcus equi	LCR, BAL preferible, hisopo faríngeo, nasal sin medio	3	
TAYL	Taylorella equigenitalis	Hisopo vaginal	3	
PTHE	Theileria equi	0.5 mL sangre EDTA	3	
PCRT	Toxoplasma gondii	0.5 mL LCR, sangre EDTA, tejidos postmortem	3	
TTF	Tritrichomonas foetus	Heces, tejidos postmortem	3	
PFIV	Virus Inmunodeficiencia Felina	0.5 mL sangre EDTA, médula ósea, aspirado de tejidos en SSF	3	
PCLF	Virus Leucemia Felina	0.5 mL sangre EDTA, médula ósea, aspirado de tejidos en SSF	3	
YERS	Yersinia enterocolitica	Heces	3	

CÓDIGO	PRUEBA GENÉTICA	TIPO DE MUESTRA		€
HCM	Gen Cardiomiopatía hipertrófica	0,5 mL sangre EDTA	21	
CIST	Gen cistinuria	0,5 mL sangre EDTA	16	
MDR1	Gen MDR-1	0,5 mL sangre EDTA	12	
GEME	Gen Merlé	0,5 mL sangre EDTA	11	
PKDR	Gen PKD	0,5 mL sangre EDTA	9	
L2HG	L2HGA	0,5 mL sangre EDTA	17	
MAC	Macrotrombocitopenia	0,5 mL sangre EDTA	17	
SASH	Síndrome autoinflamatorio del sharpei	0,5 mL sangre EDTA	6	
TNS	TNS - Síndrome del neutrófilo atrapado Border collie	0,5 mL sangre EDTA	7	

 Días laborables desde la llegada al laboratorio

TÉCNICA

TIPO DE MUESTRA



€

Urianálisis + urocultivo (UCCO)
5 mL orina
por cistocentesis*

Sedimento, pH, c. cetónicos, nitritos, densidad, medición por espectrofotometría de proteínas creatinina, GGT, glucosa, bilirrubina total. cociente proteína/creatinina (UPC), cociente GGT/creatinina, microalbuminuria, cultivo de orina que incluye identificación y antibiograma adecuado a la cepa.



Para evaluar
pielonefritis, UTI,
cristaluria

1-3 días

Urocultivo (EXC)
5 mL orina
por cistocentesis

Sedimento, cultivo de orina que incluye identificación y antibiograma adecuado a la cepa.



Para evaluar
pielonefritis, UTI

3 días

Urianálisis (URCO)
5 mL orina
preferible por
cistocentesis*

Sedimento, c. cetónicos, nitritos, pH, medición por espectrofotometría de proteínas creatinina, GGT, glucosa, bilirrubina total, cociente proteína/creatinina (UPC), cociente GGT/creatinina, microalbuminuria.

MD

PRUEBA	TIPO DE MUESTRA		€
Análisis cálculo vesical	Cálculo urinario	3	
Citología sedimento urinario	1-2 mL orina micción espontánea	2	
Cociente cortisol/crea en orina	0.5 mL orina	1	
Cociente proteína/crea en orina	0.5 mL orina	1	
Microalbuminuria	0.5 mL de orina	1	
Excreción fraccionada electrolitos orina	1 mL orina + 1 mL suero	1	
PCR Adenovirus Tipo 1	0.5 mL orina	3	
PCR Encephalitozoon cuniculi	0.5 mL orina	3	
PCR Leptospira patógena	0.5 mL de orina	3	
PCR Moquillo canino	0.5 mL de orina	3	
Proteinograma en orina	10 mL de orina. Indica si la proteinuria es glomerular, tubular o mixta	2	

* Si se prevé que se ampliará a cultivo. Si se quiere realizar una citología urinaria para descartar neoplasia, enviar orina por micción espontánea o sondaje traumático



Días laborables desde la llegada al laboratorio

Si el parasitario es negativo, puedes ampliar a Ag de Giardia. Podemos hacer un cultivo de heces adicional, pero lo ideal para descartar infecciones es la PCR

TÉCNICA	TIPO DE MUESTRA	€
Estudio ampliado de heces (EAH)	Análisis de heces: flotación, sedimentación y examen en fresco. Extensión-tinción de heces, ag de Giardia , sangre oculta y digestión en heces (el animal no debe ingerir carne 24h antes). Muestra de Heces de 3 días	1
Digestión de Heces (DIHE)	Sangre oculta y digestión en heces (el animal no debe ingerir carne 24h antes). Muestra de heces.	1
Sangre oculta en Heces (HSAN)	El animal no debe ingerir carne 24h antes. Muestra de heces	1
Coprocultivo (CAMP)	Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella sp., Yersinia enterocolitica. Para Clostridium sp. consultar la sección de biología molecular. Muestra de heces	3-4
Coprocultivo adicional (CMPA)	Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella sp., Yersinia enterocolitica. Para Clostridium sp. consultar la sección de biología molecular. Muestra de heces	3-4
Migración Larvaria (BAER)	Técnica de Baermann. Te recomendamos que lo hagas sólo si antes han salido negativas la flotación y sedimentación, ya que en ellas las larvas se pueden observar también. Muestra de Heces de 3 días (al menos 70 g)	3
Parasitológico de heces (APHE)	Flotación, sedimentación y examen en fresco. Heces de 3 días	1
E. ampliado heces + coprocultivo (EAHC)	Flotación, sedimentación y examen en fresco. Heces de 3 días. Cultivo de Campylobacter spp., Salmonella spp., Shigella sp., Yersinia enterocolitica.	3-4
Entérico felino 1 (2027)	PCRs de Clostridium perfringens enterotoxina, C. difficile toxina A y B, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Salmonella spp., Tritrichomonas foetus, Giardia sp., Toxoplasma gondii	3-4
Entérico felino 2 (2028)	PCRs de Toxoplasma gondii, Salmonella spp., Tritrichomonas foetus, Giardia sp. Muestra de heces	3-4
Entérico felino 3 (2029)	PCRs de Tritrichomonas foetus, Giardia sp. Muestra de heces	3-4
Digestivo equino (2035)	PCRs de Clostridium perfringens enterotoxina, C. perfringens toxina alfa, Salmonella spp., Clostridium difficile Toxina A y B. Muestra de heces	3-4
General ave 1 (2037)	Poliomavirus, Circovirus, Chlamydomphila. Muestra de heces, sangre EDTA o pluma	3-4
General ave 2 (2038)	Polyomavirus, Circovirus, Herpesvirus, Chlamydomphila, Chlamydia spp., Bornavirus. Muestra de heces, sangre EDTA o pluma	3-4



Días laborables desde la llegada al laboratorio

PCRs en muestra de heces


AGENTE		€
Encephalitozoon cuniculi	3	
C. perfringens alfatoxina	3	
C. perfringens enterotoxina	3	
Campylobacter coli	3	
Campylobacter jejuni	3	
Campylobacter spp.	3	
Adenovirus reptil	15	
Adenovirus tipo 2	3	
Chlamydia spp.	3	
Chlamydomphila psittaci	3	
Clostridium difficile Toxina A y B	3	
Clostridium perfringens	3	
Coronavirus canino	3	
Coronavirus felino	3	
Cryptosporidium sp.	3	
E. coli enterohemorrágico	2	
E. Coli enteropatógeno	2	
Herpesvirus equino tipo 2	3	
Herpesvirus equino tipo 5	3	
Herpesvirus reptil	7	
Moquillo canino	3	
Neospora caninum	3	
Panleucopenia felina	3	
Paramixovirus	3	
Parvovirus canino	3	
Salmonella spp.	3	
Shigella spp.	3	
Toxoplasma gondii	3	
Tritrichomonas foetus	3	
Yersinia enterocolitica	3	



Días laborables desde la llegada al laboratorio



CÓDIGO	TÉCNICA	TIPO DE MUESTRA	€
CAMP	Cultivo de heces	Detección de <i>Campylobacter</i> spp., <i>Salmonella</i> spp, <i>Shigella</i> sp., <i>Yersinia enterocolitica</i> . Para <i>Clostridium</i> sp. consultar la sección de biología molecular	4
HEMC	Hemocultivo	Solicitar botellas de hemocultivo a laboratorio	5
CUAN	Cultivo de aerobios y anaerobios	Para anaerobios IMPORTANTE consultar con laboratorio. Indicado para bilis, otitis media, artritis séptica, abscesos dentales.	5
LIQB	Cultivo de líquidos biológicos	Jeringa estéril con líquido. Citología	3-4
SKIN	Cultivo de piel	Incluye cultivo de levaduras. Hisopo con medio, citología	3-4
PUS	Cultivo especial	Implantes quirúrgicos, catéteres, tejidos postmortem	5
EXA	Cultivo estándar	fístulas, exudados (no incluye cultivo de levaduras). Citología	3-4
EXN	Cultivo micológico	Aislamiento e identificación de dermatofitos. Pelos, costras, uñas	hasta 21
NASA	Cultivo nasal	Incluye cultivo de levaduras. Hisopo con medio, citología	3-4
EXCO	Urocultivo	Incluye evaluación previa de sedimento	3-4
EXO	Cultivo ótico unilateral (bilateral 10 € más)	Incluye cultivo de levaduras e identificación y antibiograma de todos los aislados. Citología.	3-4



Días laborables desde la llegada al laboratorio

HISTOPATOLOGÍA, CITOLOGÍA

CÓD.	TÉCNICA	TIPO DE MUESTRA	€
SMC	Citología de órgano o nódulo único	Informe detallado con fotos de las células observadas	2
CIT2	Citología de varios órganos o nódulos	Informe detallado con fotos de las células observadas	2
OTCI	Citología ótica o dermatológica	Portaojetos fijados sin teñir o teñidos para segunda opinión	1
LICT	Citología de líquidos biológicos	0.5 mL a 1 mL en tubo EDTA, orina	2
BIP	Biopsia de 1 órgano o nódulo	Informe detallado con fotos de las células observadas	4-5
BVO	Biopsia de varios órganos	Implantes quirúrgicos, catéteres, tejidos postmortem en solución salina estéril	5
NECR	Necropsia de animal hasta 10 kg de peso	Informe detallado con diagnósticos diferenciales de las posibles causas de muerte. Incluye incineración colectiva.	10-12

ANÁLISIS DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS

Para que la calidad de los resultados sea óptima, necesitamos que el líquido se envíe en dos tipos de tubos: **tubo EDTA y tubo sin anticoagulante ni gel (vale también una jeringa)**. Asimismo, es necesario sobre todo en derrames cavitarios que se remita **suero del animal** para poder correlacionar los niveles de ciertos analitos en suero y líquido que ayudan a determinar la causa del derrame.

CÓD.	PERFIL	DETERMINACIONES	€
ABDO	Estudio efusión abdominal	Proteínas, recuento, bioquímicas sanguíneas y en líquido y citología	2
PLEU	Estudio efusión pleural	Proteínas, recuento, bioquímicas sanguíneas y en líquido y citología	2
SINO	Estudio líquido sinovial	Proteínas, recuento, coágulo de mucina, viscosidad y citología	2
LCR	Estudio de líquido cefalorraquídeo	Proteínas, recuento, glucosa y citología	2
PELB	BAL + cultivo	Cultivo de líquido biológico + citología	3-4



Días laborables desde la llegada al laboratorio

Cuando en el perfil escribimos "frotis sanguíneo", no nos referimos solamente a realizar un control visual de calidad del recuento automático. Realizamos evaluación citológica sanguínea de la serie roja con recuento de poiquilocitos, policromatófilos (reticulocitos) e inclusiones intra-eritrocitarias. En la serie blanca evaluamos y cuantificamos la presencia de morfologías anormales y cambios tóxicos, y en la serie plaquetar, si hay presencia de agregados, macroplaquetas, y si el recuento se corresponde con el medido por el autoanalizador. Además, reportamos la presencia de parásitos como microfilarias o Hepatozoon, sin cobrar aparte una citología.

CÓDIGO	PRUEBA/PERFIL	INCLUYE	TIPO DE MUESTRA	 €
AT	Antitrombina	Evaluación de procesos de hipercoagulabilidad	1 mL plasma citrato congelado	5
FPS	Citología de sangre periférica	Evaluación de alteraciones morfológicas y presencia de agentes infecciosos	frotis sangre + 0,5 mL E	1
PCID	Coagulación extra	Hemograma, frotis sanguíneo, TP y TPPa, fibrinógeno, dímeros-D	0,5 mL E y 1 mL plasma citrato	1
PECO	Coagulación simple	Hemograma, frotis sanguíneo, TP y TPPa	0,5 mL E y 0,5 mL plasma citrato	1
CO	Coombs directo can.	Anemia hemolítica inmunomediada perros	0,5 mL E	1
CDF	Coombs directo fel.	Anemia hemolítica inmunomediada gatos	0,5 mL E	1
DIMD	Dímeros D	Evaluación de procesos de hipercoagulabilidad	0,5 ml plasma citrato	1
HGMO	Estudio méd. ósea	Hemograma del mismo día que el aspirado de médula. Estudio citológico de sangre periférica y médula.	0,5 mL E, médula ósea en tubo E y frotis de ambos	2
FIB	Fibrinógeno	Evalúa hipercoagulabilidad, marcador de inflamación	0,5 mL plasma citrato	1
01	Hemograma	Hematíes, hemoglobina, hematocrito, VCM, HCM, CHCM, RDW, plaquetas, VPM, recuento total y diferencial de leucocitos. Frotis sanguíneo	0,5 mL E y frotis sanguíneo	1
PRET	% y recuento de reticulocitos	En casos de anemia o de sospecha de pérdida crónica de sangre. Se valoran también cuerpos de Heinz y en gatos se diferencian los agregados de los punctata.		1
RETA	Reticulocitos adicionales a hemograma		0,5 mL E	1

0,5 mL E = 0,5 mL de sangre entera en tubo EDTA



Días laborables desde la llegada al laboratorio

CÓDIGO	PRUEBA/PERFIL	INCLUYE/TIPO DE MUESTRA	€
FVW	Factor Von Willebrand	Diagnóstico de hemofilia, Mide concentración en sangre como porcentaje. 1 mL plasma citrato congelado.	7
VW1	PCR enfermedad de von Willebrand	Consultar con el laboratorio el tipo a diagnosticar (I, II, III) *. 1 mL EDTA	7
PLTS	Recuento de plaquetas	Recuento automático y manual en el frotis sanguíneo, Evaluación de macroplaquetas, alteraciones morfológicas y agentes infecciosos. 0,5 mL sangre E, 0,5 mL sangre entera en tubo con citrato y frotis sanguíneo	1
TPR	Tiempo de Protrombina	0.5 mL de plasma citrato	1
TTP	T. Tromboplastina parcial activada	0.5 mL de plasma citrato	1
TT	Tiempo de Trombina	0.5 mL de plasma citrato	2




Para evaluar la hemostasia, es fundamental que la extracción de sangre se realice de forma "limpia", es decir, si la aguja no ha entrado directa a la vena una vez que se ha pinchado la piel, es muy probable que al redirigirla hacia la vena se active la cascada de la coagulación. Es mejor repetir la venopunción en otro sitio que seguir intentando alcanzar el vaso.

Otro factor fundamental para que la muestra sea analizable, es que la proporción de citrato y de sangre sea la establecida por la marca del tubo.

Si éste no se llena hasta la marca, o el volumen de sangre la sobrepasa aunque sea por poco, los resultados no serán fiables

Protocolo

- Extraer el volumen apropiado de sangre según el tubo a utilizar
- Llenar hasta la marca que indica el tubo y mover suavemente unas 10 veces hasta conseguir una mezcla completa de la sangre con el citrato
- Centrifugar 5 minutos a 3500 rpm
- Separar el plasma citratado en un tubo seco aparte y refrigerar o congelar, Si hay hemólisis o lipemia, la muestra no es válida y hay que repetir la extracción.
- Enviar a laboratorio junto con un acumulador de frío.



0,5 mL E = 0,5 mL de sangre entera en tubo EDTA
* No susceptible de aplicar a rappel



PRUEBA

PÁGINA

A

Aborto/infertilidad PCR	20, 22, 23
Abdominal, efusión	32
Ác. Biliares 1 determinación	11
Ác. Biliares adicionales	11
Ác. Fólico (Folatos)	11
Ác. Metilmalónico	11
Acetilcolinesterasa eritrocitaria	11
Ácido Úrico	11
Adenovirus Acs	17
Adenovirus reptil PCR	24, 30
Adenovirus tipo 1 PCR	24, 28
Adenovirus tipo 2 Acs	24
Adenovirus tipo 2 PCR	24, 30
Ag Cryptococcus spp	15, 16, 18, 20, 22
Albúmina	11
ALT	11
Análisis cálculo vesical	7, 28
Anaplasma spp. Acs	20, 24
Anaplasma phagocytophilum Acs	17, 19
Anaplasma phagocytophilum PCR	24
Anaplasma platys PCR	24
Anaplasma spp. PCR	24
Anemia infecciosa equina Acs	19
Angiostrongylus Acs	17
Antitrombina	33
Arteritis viral equina Acs	19
Arteritis viral equina PCR	24
Aspergillus sp. Acs	17
AST	11

B


Babesia canis Acs	17
Babesia caballi Acs	17
Babesia caballi PCR	24
Babesia canis PCR	24
Babesia felis PCR	24
Babesia spp PCR	24
Baermann	8, 29

Bartonella spp. Acs	14
Bartonella spp. PCR	24
Bilirrubina total	11
Biopsia de 1 órgano o nódulo	32
Biopsia de varios órganos	32
Bordetella bronchiseptica PCR	24
Bordetella spp. PCR	24
Bornavirus PCR	24
Borrelia burgdorferi Acs	17
Borrelia burgdorferi, caballo Acs	19
Borrelia burgdorferi PCR	24
Bqs adicionales a perfil 11	11
Broncoalveolar, lavado	32
Brucella spp Acs	17
Brucella canis PCR	24

C

C. Mycoplasma haemocanis PCR	24
C. Mycoplasma haemofelis PCR	24
C. Mycoplasma haemominutum PCR	24
C. Mycoplasma turicensis PCR	24
C. perfringens alfatoxina PCR	24
C. perfringens enterotoxina PCR	24
Calcio	11
Calcio iónico	11
Calicivirus Acs	17
Calicivirus Felino PCR	24
Campylobacter coli PCR	24
Campylobacter spp. PCR	24
Cefalorraquídeo, líquido	32
Chlamydia spp. PCR	24
Chlamydia psittaci Acs	17
Chlamydia felis PCR	25
Chlamydia psittaci PCR	25
Citología de líquidos biológicos	32
Citología de órgano o nódulo único	32
Citología de sangre periférica	33
Citología de varios órganos o nódulos	32
Citología ótica o dermatológica	32
CK (Creatin Kinasa)	11

Clasificación racial PCR	25
Cloro (Cloruros)	11
Clostridium difficile Toxina A y B PCR	25
Cobalamina (Vit B12) + Ác Fólico	11
Cobalamina (Vit B12)	11
Cobre	11
Cobre en tejidos	11
Cociente cortisol/creatinina en orina	7
Colesterol total	11
Colinesterasa	11
Complejo M. Bovis PCR	25
Complejo M. Avium PCR	25
Coombs directo	33
Coprocultivo	8, 29
Coronavirus canino heces PCR	25
Coronavirus felino heces PCR	25
Coronavirus felino Acs.	18
Coronavirus felino PCR	25
Coxiella burnetii PCR	25
Creatinina	11
Cryptococcus spp. Ag	15, 18
Cryptococcus gatti PCR	25
Cryptococcus neoformans PCR	25
Cryptococcus spp. PCR	25
Cryptosporidium Ag	18
Cryptosporidium spp. PCR	25
Cultivo de aerobios y anaerobios	31
Cultivo de heces	31
Cultivo de líquidos biológicos	31
Cultivo de piel	31
Cultivo especial	31
Cultivo estándar	31
Cultivo micológico	31
Cultivo nasal	31
Cultivo orina	31
Cultivo ótico unilateral	31
Cytauxzoon felis PCR	25



PRUEBA

PÁGINA

D

Digestión de Heces	28
Digestivo equino PCR	22
Dímeros-D	32
Dirofilaria Ag	17
Dirofilaria immitis PCR	23
Dirofilaria repens PCR	23

E

E. cuniculi, conejo, cobaya Acs	18
E. coli enterohemorrágico PCR	24
E. coli enteropatógeno PCR	24
Ehrlichia canis Acs	17
Ehrlichia canis PCR	24
Encefalitozoon cuniculi PCR	24
Enf. Gumboro PCR	24
Enf. pico y plumas PCR	24
Enf. von Willebrand tipo I PCR	33
Estimulación con ACTH	9
Estudio ampliado de heces	8
Estudio de médula ósea	32

F

Fibrinógeno	31
ALP	11
Fósforo	11
Fructosamina	11
Fructosamina adicional	11

G

Gen Cardiomiopatía hipertrófica	26
Gen cistinuria	26
Gen MDR-1	26
Gen Merlé	26
Gen PKD	26
General ave 1 (Bq)	10
General ave 1 PCR	28
General ave 2 PCR	28
Género Mycobacterium PCR	25
GGT	11
Giardia Ag	17
Giardia Ag roedores, hurón, conejo	18
GLDH	11
Glucosa	11

H

Helicobacter pylori PCR	26
Hemocultivo	31
Hemograma	33
Hepatozoon canis PCR	26
Herpesvirus Acs	18
Herpesvirus aviar PCR	26
Herpesvirus canino PCR	26
Herpesvirus equino 1-4 PCR	26
Herpesvirus equino Acs	19
Herpesvirus equino tipo 2 PCR	26
Herpesvirus equino tipo 5 PCR	26
Herpesvirus felino PCR	26
Herpesvirus reptil PCR	26

I

Influenza A PCR	26
Ionograma	10

L

L2HGA	27
LDH	11
Leishmania Acs	18
Leishmania infantum (q-PCR)	26
Leptospira Acs	18
Leptospira caballo Acs	18
Leptospira patógena PCR	26
Lipasa pancreática adicional	11
Lipasa pancreática específica	11


M

Macrotrombocitopenia PCR	27
Magnesio	11
Micoplasma hemotrópico (spp.) PCR	26
Micoplasma respiratorio (spp.) PCR	26
Microalbuminuria	11
Migración Larvaria (Baermann)	8, 29
Mixomatosis conejo Acs	19

Moquillo Canino Acs	14, 18
Moquillo Canino Ag	18
Moquillo canino PCR	26
Mycobacterium avium PCR	26
Mycobacterium Bovis PCR	26
Mycobacterium Tuberculosis PCR	26
Mycobacterium spp PCR	26
Mycoplasma felis PCR	26
Mycoplasma spp. PCR	26
Necropsia de animal	32
Neospora caninum Acs	14, 18
Neospora caninum PCR	26, 30
Neurológico canino 1 (perfil bq y acs.)	15
Neurológico canino 2	15
Neurológico canino 3	15
Neurológico canino 4	15
Neurológico canino 5	15
Neurológico canino 6	15
Neurológico canino 7	15
Osmolalidad en suero	11

P

Panleucopenia Felina Acs	18
Panleucopenia Felina Ag	18
Panleucopenia felina PCR	26, 30
Parainfluenza PCR	26
Paramixovirus PCR	26
Parasitológico de heces	8, 29
Parentesco PCR	26
Parvovirus Acs	18
Parvovirus Ag	14, 18
Parvovirus canino PCR	26
Perfil equino 1 y 2	10
Perfil Adrenal	6, 9
Perfil Adrenal 3 cortisoles	6, 9
Perfil Anemia felino 1 y 2	22
Perfil Ave (bioquímico)	10



Perfiles Básicos serológicos	12
Perfil Coagulación extra	33
Perfil Coagulación simple	33
Perfil Completo básico	5
Perfil Completo premium	5
Perfil Conejo (hg y bq)	10
Perfil Digestivo agudo (hg y bq)	8
Perfil Digestivo crónico canino (hg y bq)	8
Perfil Digestivo crónico felino (hg y bq)	8
Perfil Digestivo vírico felino	14
Perfil Entérico canino PCR	20
Perfil Entérico felino 1 PCR	21
Perfil Entérico felino 2 PCR	21
Perfil Entérico felino 3 PCR	21
Perfil Equino 1 (hg y bq)	10
Perfil Equino 2 (hg y bq)	10
Perfiles Extras serológicos	12
Perfil General	5
Perfil Fiebre origen desconocido	20
Perfil Hepático	7
Perfil Hepático premium	7
Perfil Hurón	10
Perfiles Mínimos serológicos	12
Perfiles Neurológicos caninos	15
Perfil neurológico Felino 1	16
Perfil neurológico Felino 2	16
Perfil neurológico Felino 3	16
Perfil neurológico Felino 4	16
Perfil neurológico Felino 5	16
Perfil Pequeño mamífero	10
Perfil Prequirúrgico	10
Perfil Renal	6
Perfil Renal Conejo	10
Perfil Reptil	10
Perfil Respiratorio 1 perro PCR	20
Perfil Respiratorio 2 perro PCR	20
Perfil Respir. fel vías altas 1 PCR	21
Perfil Respir. fel vías altas 2 PCR	21
Perfil Respir. fel vías bajas PCR	21
Perfil Seguimiento epilepsia	15, 16
Perfil Tiroideo canino	9
Perfil Tiroideo felino	6, 9

Plaquetas, recuento	33
Polyomavirus PCR	27
Pleural, efusión	32
K	11
Poxvirus PCR	27
ProBNP canino o felino	11
Proteína C reactiva	11
Proteínas totales	11
Proteínas ultrasensibles (LCR, orina)	11
Proteinograma en orina	28
Proteinograma sérico mamífero	11
Proteinograma sérico reptil o ave	11

R

Respiratorio conejo PCR	23
Respiratorio equino PCR	23
Respiratorio hurón PCR	23
Respiratorio, lavado	32
Reticulocitos, recuento	33
Rickettsia conorii Acs	19
Rickettsia spp. PCR	27
Rinoneumonitis equina PCR	27

S

Salmonella spp. PCR	27
Sangre oculta en Heces	29
Sarcoptes scabiei Acs	19
SDMA	11
Selenio	11
Sexaje aves PCR	27
Shigella spp. PCR	27
Síndrome autoinflamatorio del sharpei	27
Sinovial, líquido	32
Sodio	11
Streptococcus equi PCR	27

T

T4 total o T4 libre + TSH	9
Taurina	11
Taylorella equigenitalis	27
Test de clonalidad PAAR	27
Tétanos Acs	19
Theileria equi PCR	27
Theileria equi, Caballo Acs	19

Tick Borne Encephalitis Acs	19
Tiempo de protrombina	34
Tiempo de tromboplastina parcial activada	34
Tiempo de trombina	34
TLI canina	11
TLI canina + vit, B12 + Ác, Fólico	11
TLI felina	11
TLI felina + vit, B12 + Ác, Fólico	11
TNS- Sd. neutrófilo atrapado Border collie	27
Toxoplasma gondii Acs	19
Toxoplasma gondii PCR	27
T. gondii, conejo, cobaya, caballo Acs	19
Treponema paraluisclunicii, conejo Acs	19
Triglicéridos	11
Trichomonas foetus PCR	27
Troponina I	11

U

Urea	11
Urianálisis	5, 28
Urianálisis + urocultivo	7, 28
Urocultivo	31

V


Von Willebrand, Ag	34
Von Willebrand, PCR	34
Virus Inmunodeficiencia Felina Acs	19
Virus Inmunodeficiencia Felina PCR	27
Virus Leucemia Felina Ag	19
Virus Leucemia Felina PCR	27

Y

Yersinia enterocolitica PCR	26
-----------------------------	----

**Te recordamos que dispones de un catálogo
online dentro del área de resultados:**

<https://cedivet.analisisonline.com/login>



CEDIVET

CENTRO DIAGNÓSTICO VETERINARIO



96 336 88 55



www.cedivet.es

@cedivetvalencia @

info@cedivet.es

